

Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

Informations Générales

Département : **35**

Commune : **Redon**

Année : **2023**


Site : **WT6780**

Information du Site : **Site-Le pré de
Canraux**

Longueur du parcours : **4.02 km**

Surface prospectée : **39.79 ha**

Observateur : **Olivier Noël**



Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

Synthèse des données par espèces

Données avec NA :

P1/P2/P3 : espèce non contactée

Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.


	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	NA	2	NA	2	2	LC	LC	modérée
<i>Alouette des champs</i>	7	10	6	23	8	NT	VU	élevée
<i>Bergeronnette printanière</i>	NA	NA	1	1	1	LC	VU	modérée
<i>Bouscarle de Cetti</i>	5	2	3	10	7	NT	LC	élevée
<i>Bruant des roseaux</i>	16	12	20	48	21	EN	VU	très élevée
<i>Bruant jaune</i>	1	1	1	3	3	VU	EN	très élevée
<i>Cisticole des joncs</i>	1	6	7	14	8	VU	LC	élevée
<i>Étourneau sansonnet</i>	1	3	1	5	1	LC	LC	modérée
<i>Faisan de Colchide</i>	NA	NA	1	1	1	LC	DD	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	9	11	14	34	21	LC	LC	modérée
<i>Fauvette des jardins</i>	NA	NA	1	1	1	NT	LC	modérée
<i>Fauvette grisette</i>	NA	6	6	12	10	LC	LC	modérée
<i>Gorgebleue à miroir</i>	2	NA	1	3	2	LC	VU	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	7	NA	1	8	6	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	1	3	4	8	5	LC	LC	modérée
<i>Locustelle luscinioïde</i>	NA	2	NA	2	2	EN	CR	majeure
<i>Locustelle tachetée</i>	NA	1	NA	1	1	NT	LC	modérée
<i>Loriot d'Europe</i>	NA	1	1	2	1	LC	VU	modérée
<i>Merle noir</i>	9	4	5	18	10	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	9	5	5	19	12	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	6	7	2	15	10	LC	LC	modérée
<i>Phragmite des joncs</i>	10	15	13	38	18	LC	LC	élevée
<i>Pic épechette</i>	1	NA	NA	1	1	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	3	7	NA	10	3	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	8	10	6	24	13	LC	LC	modérée
<i>Pipit des arbres</i>	1	2	3	6	3	LC	LC	mineure
<i>Pouillot véloce</i>	21	15	12	48	25	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	17	17	8	42	24	LC	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	3	NA	NA	3	3	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâle</i>	1	3	6	10	5	NT	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	15	7	9	31	18	LC	LC	modérée

Légende générale


Contacts

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|  | Premier passage : avril |  | Itinéraire |
|  | Deuxième passage : mai | | |
|  | Troisième passage : juin |  | Territoire théorique |
| 3 | Code atlas | | |

Accenteur mouchet



Aigrette garzette



300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Alouette des champs



Bergeronnette flavéole (*M.f.flavissima*)




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bergeronnette printanière



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bouscarle de Cetti



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bruant jaune




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Buse variable




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Caille des blés




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Canard colvert



300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, AeroGrid, IGN, IGR, UPR-EGP, and the GIS User Community



Chardonneret élégant




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Cigogne blanche




300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Cisticole des joncs



Corneille noire



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Coucou gris




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Cygne tuberculé




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Faisan de Colchide




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Faucon crécerelle




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

18

Fauvette des jardins



3

300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3


Fauvette grisette




300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Fauvette à tête noire



Foulque macroule




300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Gallinule poule-d'eau



Geai des chênes




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Gorgebleue à miroir




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grimpereau des jardins




300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Grive musicienne



Hirondelle de rivage




300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Hirondelle rustique



Hypolaïs polyglotte




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Héron cendré




300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Locustella luscinioides



Locustelle tachetée



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Loriot d'Europe



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Merle noir



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Milan noir

300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange bleue



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange carbonnière



Mésange à longue queue




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pic vert



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pic épeiche



Pic épeichette



Pigeon ramier



Pipit des arbres



300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pipit farlouse

300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Pipit indéterminé



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Pouillot fits



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pouillot véloce





300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Rougegorge familial






300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Serincini



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Sittelle torchepot



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Tadorne de Belon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Tarier pâtre



Tourterelle des bois




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Traquet motteux




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Troglodyte mignon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Vanneau huppé




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Étourneau sansonnet



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3