



sepnb



# Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

## Informations générales

Département : 56

Commune : GAVRES

Année : 2022


Site : ONCB-LAgglo-Gavres

Longueur du parcours : 3.23 km

Surface prospectée : 31.5 ha

Observateur : Hémery François

## Localisation



# Itinéraire ONCB-LAgglo-Gavres - 2022



# Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins...) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

## Rappels

### Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable) ;
- Les oiseaux coloniaux (hirondelles, martinets, moineaux) et ceux ayant un territoire trop vaste (pics, rapaces) sont considérés hors protocole ;
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin ;
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

### Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de les délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Bergeronnette grise, Mésange à longue queue...).

# Synthèse des données par espèce

	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	10	9	7	26	13	LC	LC	modérée
<i>Alouette des champs</i>	5	5	6	16	7	NT	VU	élevée
<i>Bergeronnette grise</i>	2	3	1	6	3	LC	LC	modérée
<i>Bouscarle de Cetti</i>	12	11	3	26	15	NT	LC	élevée
<i>Bruant des roseaux</i>	NA	1	NA	1	1	EN	VU	très élevée
<i>Chardonneret élégant</i>	2	1	NA	3	1	VU	LC	élevée
<i>Cisticole des joncs</i>	7	9	7	23	11	VU	LC	élevée
<i>Fauvette à tête noire</i>	7	5	8	20	9	LC	LC	modérée
<i>Fauvette des jardins</i>	NA	2	NA	2	2	NT	LC	modérée
<i>Fauvette grisette</i>	7	9	6	22	13	LC	LC	modérée
<i>Fauvette pitchou</i>	NA	3	NA	3	1	EN	VU	très élevée
<i>Gorgebleue à miroir</i>	7	5	4	16	9	LC	VU	modérée
<i>Grive musicienne</i>	3	2	NA	5	2	LC	LC	modérée
<i>Hypolaïs polyglotte</i>	NA	1	1	2	2	LC	LC	mineure
<i>Linotte mélodieuse</i>	19	14	6	39	18	VU	LC	modérée
<i>Locustelle tachetée</i>	2	1	NA	3	3	NT	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	7	10	8	25	6	LC	LC	modérée
<i>Phragmite des joncs</i>	21	17	13	51	25	LC	LC	élevée
<i>Pigeon ramier</i>	10	9	7	26	8	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	NA	1	1	2	1	LC	LC	modérée
<i>Pipit farlouse</i>	2	5	5	12	4	VU	VU	élevée
<i>Pipit maritime</i>	1	NA	NA	1	1	NT	LC	très élevée
<i>Pouillot véloce</i>	9	7	6	22	11	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	3	NA	1	4	4	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâtre</i>	5	6	7	18	6	NT	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	12	6	3	21	12	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	1	4	3	8	4	VU	VU	élevée

## Données avec NA :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire.

# Légende générale

## Contacts

-  Premier passage : avril
-  Deuxième passage : mai
-  Troisième passage : juin
-  Code atlas
-  Itinéraire
-  Territoire théorique

# Accenteur mouchet




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



# Alouette des champs



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



# Bergeronnette grise



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Bouscarle de Cetti



# Bruant des roseaux



300 m  
1000 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3



# Chardonneret élégant



300 m  
1000 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

# Chevalier gambette



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Cisticole des joncs




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3


Corneille noire



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

Coucou gris



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3





300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Fauvette à tête noire



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Fauvette des jardins



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Fauvette grisette



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3



# Fauvette pitchou



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Gorgebleue à miroir



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Grive musicienne



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



# Hirondelle de rivage



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Hirondelle rustique



300 m  
1000 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

# Hypolaïs polyglotte



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Linotte mélodieuse



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Locustelle tachetée



1

2

3

300 m  
1000 ft

Passage  
P1  
P2  
P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



# Mésange charbonnière



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Moineau domestique




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



# Phragmite des joncs




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Pie bavarde



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Pigeon biset domestique



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3




Pinson des arbres



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3


Pipit farlouse



300 m  
1000 ft


**Passage**  
P1  
P2  
P3

Pipit maritime



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Rougorgorge familial



300 m

1000 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

Tarier pâtre



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3


# Troglodyte mignon



300 m  
1000 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

# Vanneau huppé



300 m  
1000 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

