



sepnb



Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

Informations générales

Département : 56

Commune : PLOEMEUR

Année : 2019


Site : VT6886

Longueur du parcours : 5.3 km

Surface prospectée : 43.748 ha

Observateur : David Jean

Localisation



Itinéraire VT6886 - 2019



Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins...) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable) ;
- Les oiseaux coloniaux (hirondelles, martinets, moineaux) et ceux ayant un territoire trop vaste (pics, rapaces) sont considérés hors protocole ;
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin ;
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de les délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Bergeronnette grise, Mésange à longue queue...).

Synthèse des données par espèce


	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	4	2	1	7	6	LC	LC	modérée
<i>Bouscarle de Cetti</i>	1	1	NA	2	1	NT	LC	élevée
<i>Bouvreuil pivoine</i>	NA	1	1	2	2	VU	NT	modérée
<i>Bruant zizi</i>	2	2	3	7	4	LC	LC	modérée
<i>Chardonneret élégant</i>	1	1	2	4	3	VU	LC	élevée
<i>Fauvette à tête noire</i>	17	10	9	36	19	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	2	NA	2	4	3	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	1	NA	NA	1	1	LC	LC	modérée
<i>Hypolaïs polyglotte</i>	NA	5	3	8	5	LC	LC	mineure
<i>Linotte mélodieuse</i>	1	NA	NA	1	1	VU	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	7	5	NA	12	7	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	1	2	NA	3	2	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	2	1	NA	3	3	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	7	1	NA	8	7	LC	LC	modérée
<i>Pie bavarde</i>	1	NA	1	2	1	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	2	1	1	4	2	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	1	1	2	4	3	LC	LC	modérée
<i>Pouillot véloce</i>	13	10	8	31	15	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	1	1	NA	2	1	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	7	6	1	14	8	LC	LC	modérée
<i>Rousserolle effarvate</i>	NA	NA	1	1	1	LC	LC	mineure
<i>Serin cini</i>	2	NA	1	3	3	VU	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	NA	NA	1	1	1	LC	LC	modérée
<i>Tourterelle des bois</i>	NA	1	2	3	2	VU	VU	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	18	10	8	36	20	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	2	3	NA	5	4	VU	VU	élevée

Données avec NA :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire.

Légende générale

Contacts

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|  | Premier passage : avril |  | Itinéraire |
|  | Deuxième passage : mai | | |
|  | Troisième passage : juin |  | Territoire théorique |
| 3 | Code atlas | | |




300 m
1000 ft

Passage


- P1
- P2
- P3

Bergeronnette grise



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bouvreuil pivoine




300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Chardonneret élégant



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Fauvette à tête noire




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grimpereau des jardins




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Grive musicienne



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Hirondelle de rivage



418

18


300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Hypolaïs polyglotte




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Linotte mélodieuse




300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Mésange à longue queue



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Mésange charbonnière



300 m
1000 ft

Passage


- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage


- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage


- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3


Pinson des arbres



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Roitelet à triple bandeau



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Rousserolle effarvate




300 m

1000 ft

Passage


- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Tourterelle des bois



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3


Troglodyte mignon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3