



sepnb



Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

Informations générales

Département : 35

Commune : SAINT-COULOMB

Année : 2022


Site : WU89

Longueur du parcours : 6.56 km

Surface prospectée : 64.093 ha

Observateur : Vilboux Esteban

Localisation



Itinéraire WU89 - 2022



Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins...) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable) ;
- Les oiseaux coloniaux (hirondelles, martinets, moineaux) et ceux ayant un territoire trop vaste (pics, rapaces) sont considérés hors protocole ;
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin ;
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de les délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Bergeronnette grise, Mésange à longue queue...).

Synthèse des données par espèce

	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	13	12	10	35	23	LC	LC	modérée
<i>Alouette des champs</i>	7	8	4	19	10	NT	VU	élevée
<i>Bouscarle de Cetti</i>	18	14	11	43	23	NT	LC	élevée
<i>Bouvreuil pivoine</i>	1	NA	2	3	3	VU	NT	modérée
<i>Bruant des roseaux</i>	1	2	2	5	2	EN	VU	très élevée
<i>Bruant jaune</i>	1	1	1	3	1	VU	EN	très élevée
<i>Bruant zizi</i>	5	11	11	27	15	LC	LC	modérée
<i>Chardonneret élégant</i>	7	8	5	20	10	VU	LC	élevée
<i>Choucas des tours</i>	1	1	NA	2	1	LC	LC	modérée
<i>Cisticole des joncs</i>	11	8	10	29	15	VU	LC	élevée
<i>Étourneau sansonnet</i>	5	3	2	10	4	LC	LC	modérée
<i>Faisan de Colchide</i>	5	4	4	13	8	LC	DD	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	24	21	20	65	35	LC	LC	modérée
<i>Fauvette grise</i>	1	1	2	4	2	LC	LC	modérée
<i>Geai des chênes</i>	2	2	1	5	2	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	3	2	4	9	6	LC	LC	modérée
<i>Grive draine</i>	1	NA	1	2	1	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	8	14	14	36	18	LC	LC	modérée
<i>Hypolaïs polyglotte</i>	NA	4	3	7	5	LC	LC	mineure
<i>Linotte mélodieuse</i>	12	8	11	31	17	VU	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	28	32	35	95	29	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	1	1	NA	2	2	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	12	7	10	29	15	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	11	5	5	21	13	LC	LC	modérée
<i>Mésange huppée</i>	NA	1	1	2	1	LC	LC	modérée
<i>Phragmite des joncs</i>	1	3	NA	4	3	LC	LC	élevée
<i>Pigeon colombin</i>	1	1	1	3	1	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	19	31	35	85	19	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	22	18	23	63	32	LC	LC	modérée
<i>Pouillot véloce</i>	44	45	36	125	61	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	1	NA	2	3	2	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	50	43	44	137	73	LC	LC	modérée
<i>Rousserolle effarvate</i>	1	8	12	21	12	LC	LC	mineure
<i>Serin cini</i>	5	11	9	25	15	VU	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	2	NA	1	3	2	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâle</i>	3	3	3	9	4	NT	LC	modérée
<i>Tourterelle turque</i>	3	2	1	6	4	LC	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	40	47	57	144	71	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	3	2	1	6	5	VU	VU	élevée

Données avec NA :


- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire.

Légende générale

Contacts

-  Premier passage : avril
-  Deuxième passage : mai
-  Troisième passage : juin
-  Code atlas
-  Itinéraire
-  Territoire théorique

Accenteur mouchet



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Aigrette garzette



300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Alouette des champs



Bergeronnette grise




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bouscarle de Cetti




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bouvreuil pivoine



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bruant des roseaux



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Buse variable




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Canard colvert



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Chardonneret élégant




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Chevalier culblanc



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Choucas des tours



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Cisticole des joncs



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Corneille noire



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Épervier d'Europe



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3


Étourneau sansonnet



Faisan de Colchide



Faucon crécerelle




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Fauvette à tête noire



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Fauvette grisette




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Foulque macroule




300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Gallinule poule-d'eau




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Geai des chênes



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Goéland argenté



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grimpereau des jardins



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grive musicienne



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3


Héron cendré



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Hirondelle de rivage




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Hirondelle rustique



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Hypolaïs polyglotte



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3


Linotte mélodieuse



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Locustelle tachetée



300 m
1000 ft


Passage
P1
P2
P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange à longue queue




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange bleue




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange charbonnière



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Mésange huppée



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Moineau domestique



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Mouette rieuse



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Phragmite des joncs



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pie bavarde




300 m

1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pigeon biset domestique




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pigeon colombin




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Pigeon ramier



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Pinson des arbres



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3



300 m
1000 ft


Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Roitelet à triple bandeau




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Rougegorge familier



300 m
1000 ft


Passage
P1
P2
P3

Rousserolle effarvate



300 m
1000 ft


Passage
P1
P2
P3



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Tadorne de Belon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Torcol fourmilier



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Tourterelle des bois



300 m
1000 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Tourterelle turque




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Troglodyte mignon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3